

- le donne potenzialmente a rischio di gravidanza non devono ricevere il sangue trasfuso da pazienti in trattamento con acitretina;
- tutti i pazienti trattati (di entrambi i sessi) devono essere istruiti a non cedere mai il farmaco ad altre persone;
- la donazione di sangue da un paziente in trattamento con acitretina è proibita durante e per i tre anni successivi al completamento del trattamento con acitretina.

A seguito di richieste di chiarimento pervenute inerenti alle modalità prescrittive e di dispensazione del farmaco, si forniscono le seguenti indicazioni:

PRESCRIZIONE

- a) L'avvio del trattamento deve essere impostato da parte di uno specialista in dermatologia che redige una *Check list per prescrizione di acitretina ad uso sistemico* che funge da piano terapeutico e che pertanto consente al medico di medicina generale di rilasciare a sua volta una prescrizione. Nella *Check list* di cui sopra devono essere ripostati, tra l'altro, gli esiti del test di gravidanza, la dose giornaliera del farmaco, la durata prevista del trattamento - entro i limiti riportati nella scheda tecnica del farmaco prescritto.
- b) La ricetta è non ripetibile limitativa (RNRL) e dovrà contenere i seguenti formalismi, quali elementi aggiuntivi di sicurezza:
 - il dosaggio giornaliero prescritto espresso in mg/die o in cps/die;
 - la durata del trattamento entro un massimo 30 giorni;
 - per le donne potenzialmente a rischio di gravidanza, l'esito del test negativo di gravidanza e la relativa data;
 - per le donne non a rischio di gravidanza, la dichiarazione di tale condizione.

Tenuto conto degli elementi di cui sopra, i farmaci a base di acitretina restano esclusi dalla prescrizione dematerializzata, pertanto dovrà essere redatta la ricetta cartacea.

DISPENSAZIONE

- c) La mancata o parziale indicazione sulla ricetta anche di uno solo degli elementi di cui sopra, rende la prescrizione non esitabile.
- d) La ricetta rilasciata a donne in età fertile/potenzialmente a rischio di gravidanza ha validità di 7 giorni dalla data di certificazione del test di gravidanza negativo (la data di certificazione è compresa nella valutazione dei 7 gg).
- a) Il farmacista avrà cura di invitare il paziente a riportare in farmacia, ai fini dello smaltimento, i quantitativi del farmaco inutilizzati alla fine del trattamento.

Si prega di diffondere la presente nota a tutti i professionisti coinvolti nella prescrizione e dispensazione di medicinali contenenti Acitretina impiegati per via sistemica e altresì ai Servizi di Ginecologia e Ostetricia, ai Consultori familiari e ai Servizi trasfusionali.

Il dirigente
Valentina Solfrini

