



Roma, 29/01/2019

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 201900001098/AG  
Oggetto: AIFA – Nota informativa importante sul rischio di gangrena di Fournier associato all'impiego di inibitori del co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i)  
Circolare n. 11351

SS  
8.4  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***AIFA – nota informativa importante:  
Rischio di gangrena di Fournier associato all'impiego di inibitori del co-  
trasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i)***

Per opportuna conoscenza e a fini di divulgazione, si trasmette la nota informativa dell'AIFA, concordata con le autorità regolatorie europee, riguardante il rischio di gangrena di Fournier (fascite necrotizzante del perineo), associato all'uso di inibitori del SGLT2 (farmaci indicati per il trattamento del diabete di tipo 2).

Si evidenziano le seguenti informazioni contenute nella nota:

- la gangrena di Fournier è un'infezione rara ma grave e potenzialmente pericolosa per la vita;
- la comparsa di infezione urogenitale o di ascesso perineale può precedere l'insorgenza di fascite necrotizzante;
- è necessario raccomandare ai pazienti di richiedere urgenti cure mediche se manifestano forte dolore, dolorabilità, eritema o gonfiore nella zona genitale o perineale in associazione a febbre o malessere;
- in caso di sospetta gangrena di Fournier, bisogna interrompere la somministrazione dell'inibitore del SGLT2 e avviare tempestivamente un trattamento (compresi antibiotici e sbrigliamento chirurgico).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Andrea Mandelli)

All. 1