



## COMUNICATO SICUREZZA FARMACI

SINTESI DELLE PIÙ RECENTI NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI AIFA

LUGLIO 2025



### NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

#### **Minirin/DDAVP (desmopressina) 50mcg/ml spray nasale, soluzione, AIC 023892033**

##### Interruzione della commercializzazione in Italia

- MINIRIN/DDAVP 50 mcg/ml spray nasale, soluzione, AIC 023892033 cesserà di essere commercializzato in Italia e non sarà più disponibile sul mercato italiano a partire approssimativamente da settembre 2025.
- Minirin/DDAVP 50 mcg/ml spray nasale, soluzione, AIC 023892033 medicinale contenente il principio attivo desmopressina è indicato per il trattamento di: diabete insipido ipofisario, idiopatico o sintomatico; poliuria e polidipsia post-chirurgiche, reversibili o permanenti e per la diagnosi differenziale del diabete insipido e prove di funzionalità renale.
- La desmopressina è di fondamentale importanza nel trattamento del diabete insipido centrale.
- Altre formulazioni di medicinali contenenti desmopressina sono disponibili in Italia per le stesse indicazioni di MINIRIN 50 mcg/ml spray nasale, soluzione.
- Nel passaggio ad altre formulazioni, deve essere determinata la dose appropriata mediante titolazione individuale.

<https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-minirin>



## NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

### Medicinali a base di risperidone in formulazione soluzione orale da 1 mg/mL

Errore terapeutico associato a sovradosaggio accidentale nei bambini e negli adolescenti

- Sono stati segnalati casi di sovradosaggio accidentale in pazienti pediatriche in terapia con risperidone 1 mg/mL soluzione orale a seguito di errori di somministrazione dovuti ad una erronea interpretazione della scala graduata del dispositivo di dosaggio.
- È importante fornire istruzioni chiare su come misurare correttamente piccoli volumi del medicinale assicurandosi che la scala graduata del dispositivo venga interpretata correttamente.
- È importante informare i genitori e/o chi si prende cura dei pazienti di:
  - Leggere attentamente il foglio illustrativo del medicinale prima dell'uso;
  - Utilizzare esclusivamente la siringa o la pipetta dosatrice fornita con il medicinale;
  - Lavare la siringa o pipetta con acqua e lasciarla asciugare all'aria dopo ogni uso;
  - Consultare immediatamente un medico in caso di sovradosaggio o comparsa di sintomi come sonnolenza, sedazione, tachicardia, ipotensione o convulsioni.

<https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-medicinali-a-base-di-risperidone>

HAI AVUTO UN EFFETTO INDESIDERATO DOPO L'USO  
DI UN FARMACO O DI UN VACCINO?  
SEGNALARE AIUTA A RENDERE I FARMACI PIU' SICURI

**NON  
DIMENTICARE  
!!!**



#### COSA SEGNALARE?

**Qualsiasi** sospetta reazione avversa, **grave e non grave, nota e non nota**, che si osserva dopo l'assunzione di un farmaco o di un vaccino



#### COME SEGNALARE?

1. On line al link <https://servizionline.aifa.gov.it/schedasegnalazioni/#/> oppure
2. Con modulo cartaceo ([qui](#)) da inviare a [farmacovigilanza@ausl.bologna.it](mailto:farmacovigilanza@ausl.bologna.it)

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:

<https://www.aifa.gov.it/web/guest/sicurezza-del-farmaci>

In alternativa contatta il responsabile aziendale della tua ASL:

[farmacovigilanza@ausl.bologna.it](mailto:farmacovigilanza@ausl.bologna.it)