

SETTORE ASSISTENZA OSPEDALIERA
AREA GOVERNO DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI

IL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO

ELISA SANGIORGI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR FILESEGNATURA.XML		
DEL	CFR FILESEGNATURA.XML		

Ai Direttori Sanitari
Alle UU.OO. ed agli Ambulatori di Neurologia
Ai Direttori dei Dipartimenti/Servizi farmaceutici
Ai Direttori dei Dipartimenti di Cure primarie, con richiesta di diffusione ai MMG
delle Aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna
Alle Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate della Regione Emilia-Romagna
Agli Ordini professionali dei Medici
Agli Ordini professionali dei Farmacisti della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: precisazioni relative alle modalità di prescrizione e dispensazione dei medicinali per somministrazione orale a base di lacosamide

Gentilissimi,

di seguito si specificano le modalità di prescrizione e dispensazione dei medicinali a base di lacosamide nella Regione Emilia-Romagna, a seguito della pubblicazione nella G.U. n. 259 del 5.11.2022 della Determina con cui AIFA ha eliminato il Piano terapeutico per la prescrizione delle formulazioni ad uso orale di lacosamide, precedentemente introdotto (G.U. n. 151 del 30.06.2022 modificato come da G.U. n. 178 del 01.08.2022).

A seguito della eliminazione del Piano terapeutico, tali formulazioni risultano classificate in classe A con prescrizione mediante ricetta ripetibile per le indicazioni come monoterapia e come terapia aggiuntiva nel "trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di età con epilessia".

La prescrizione sia da parte dei MMG che da parte dello specialista può quindi avvenire mediante ricetta SSN, nel rispetto delle indicazioni attualmente rimborsate; tale prescrizione consente l'erogazione dei medicinali a base di lacosamide da parte delle farmacie convenzionate.

Si ricorda che non sono attualmente rimborsate dal SSN le indicazioni di lacosamide come:

- monoterapia e terapia aggiuntiva nel "trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in bambini tra 2 e 4 anni di età con epilessia"
- terapia aggiuntiva nel "trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie (PGTCS) in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 4 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica".

Cordiali saluti

Elisa Sangiorgi
(firmato digitalmente)

Viale Aldo Moro 21 tel 051.527.7279 / 7280
40127 Bologna www.regione.emilia-romagna.it

e-mail: segrosp@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrosp@postacert.regione.emilia-romagna.it